

くすりのしおり

内服剤

2016年03月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：アムバロ配合錠「オーハラ」

主成分：バルサルタン (Valsartan)
アムロジピンベシル酸塩 (Amlodipine besilate)

剤形：帯黄白色の錠剤、直径 8.6mm、厚さ 3.9mm

シート記載：アムバロ配合錠「オーハラ」、バルサルタン 80mg、アムロジピン 5mg、
血圧降下薬、AmvaloCombinationTab「OHARA」



この薬の作用と効果について

体内で産生されるアンジオテンシン II の血管収縮作用を遮断し、また末梢血管の拡張により高血圧症の血圧を下げます。

通常、高血圧症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。糖尿病、腎障害、肝障害、高カリウム血症、透析中、減塩療法中、手術予定がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<>> :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は1回1錠を1日1回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時点ですぐに1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合は服用しないで、その後は指示された時間から服用してください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高所での作業、車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。
- ・グレープフルーツジュースと一緒に飲むと、この薬の作用が強くなる場合がありますので避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、めまい、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・顔面や唇、咽頭や舌の腫れ、息苦しい [血管浮腫]
- ・食欲不振、全身倦怠感、皮膚や白目が黄色くなる [劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸]
- ・尿量減少、浮腫、食欲不振 [腎不全]
- ・意識消失、嘔吐、冷感 [ショック、失神、意識消失]
- ・唇や手足のしびれ、筋力の減退、手足の麻痺 [高カリウム血症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関にご相談ください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。